

用藥指導單張

衛教小組 DE14590101

學名：Somatrogen

商品名：NGENLA 60MG/1.2ML(自費)

中文名：能增樂預填充注射筆



一、此藥品的用途是什麼？

適用於治療因生長激素分泌不足導致生長障礙之兒童病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

用量

建議劑量為每週一次皮下注射 0.66 毫克/公斤體重。每支預填充注射筆可根據醫師開立的處方設定並提供不同劑量。根據個別病人的需求，劑量可能會向上或向下取整。當需要的劑量高於 30 毫克（即體重 > 45 公斤）時，必須分兩次注射。更換自日用型生長激素藥品後的病人起始劑量 對於更換自日用型生長激素藥品的病人，可以在最後一次日常注射後的第二天以 0.66 毫克/公斤/週的劑量開始每週 somatrogen 治療。服劑量病人應維持其常規用藥日。若錯過劑量，應在錯過劑量之後 3 天內盡快注射 somatrogen，然後恢復平常每週一次的用藥時間表。若錯過劑量超過 3 天，應略過該次錯過的劑量，在常規排定的用藥日注射下一劑。在上述兩種情況下，病人都可以恢復其每週一次常規用藥。變應用藥日若需要，可以變更每週用藥日，只要兩次用藥之間至少相隔 3 天即可。選擇新的用藥日後，應繼續每週用藥一次。

用法

Somatrogen 是經皮下注射給予。Somatrogen 是從腹部、大腿、臀部或上臂注射。注射部位應每次用藥時輪替。上臂和臀部注射應由照護者進行。病人和照護者應接受訓練，以確保了解用藥程序以支持自我用藥。若需要注射超過一次才能提供完整劑量，應該從不同注射部位進行每次注射。每週注射一次 somatrogen，在各週同一天的任何時刻注射。NGENLA預填充注射筆 60 毫克 每支預填充注射筆在單次注射中以每單位0.5 毫克（0.01 毫升）的增量可提供 0.5 毫克至 30 毫克 somatrogen的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

過敏反應

使用日用型生長激素藥品曾有發生嚴重全身性過敏反應（例如嚴重過敏性反應、血管性水腫）之報告。當發生嚴重過敏反應時，應立即中止使用 somatrogen；應依照標準照護對病人進行及時治療並進行監測，直到徵兆和症狀消失。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE14590101

學名：Somatrogen

商品名：NGENLA 60MG/1.2ML(自費)

中文名：能增樂預填充注射筆



五、此藥會造成什麼副作用？

使用 somatrogen 治療後常見的不良反應包括注射部位反應、頭痛和發熱。

六、此藥儲存時的條件為何？

原包裝2-8℃冰箱避光儲存。首次使用後冷藏避光可保存28天。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師