

用藥指導單張

衛教小組 DQ8180201

學名：Docetaxel

商品名：taxotere ★ 20mg/1ml (低劑量)

中文名：剋癌易注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌、胃腺癌、頭頸癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

乳癌：

用於可手術切除，具有淋巴結轉移的乳癌之輔助性療法。建議劑量為每三週用藥一次，每次輸注doxorubicin 50毫克/平方公尺及cyclophosphamide 500毫克/平方公尺1小時後，給予docetaxel 75毫克/平方公尺，共6個療程（詳見劑量調整）。用於治療局部晚期或轉移性乳癌，docetaxel單方治療(monotherapy)時之建議劑量為100毫克/平方公尺；第一線治療(First-line)時之建議劑量為75毫克/平方公尺體表面積，併用doxorubicin 50毫克/平方公尺體表面積。

非小細胞肺癌：

對於未曾接受化療之患者，建議劑量為75毫克/平方公尺，隨後以cisplatin 75毫克/平方公尺給藥30-60分鐘，或carboplatin（濃度曲線下面積6毫克/公撮·分）給藥30-60分鐘，對先前以含鉑化學治療失敗之患者，以docetaxel 75毫克/平方公尺單一藥物治療。

前列腺癌：

建議劑量為75毫克/平方公尺。

胃腺癌：

Docetaxel的建議劑量為75毫克/平方公尺，輸注時間為1小時，隨後以cisplatin 75毫克/平方公尺輸注1-3小時（兩者皆只於第一天給藥）。

頭頸癌：

針對頭頸部無法開刀之局部進行性鱗狀細胞癌(SCCHN) 所給予的放射治療前的引導性化療，TAXOTERE的建議劑量為75毫克/平方公尺，輸注時間為1小時，隨後給予cisplatin 75毫克/平方公尺，輸注1小時（於第一天給藥），繼之給予5-fluorouracil，每日劑量為750毫克/平方公尺，連續輸注5天。此療程為每3週進行一次，共給予4個療程。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. Taxotere 輸注液需在配製好四小時內以靜脈輸注方式使用（包含輸注時間一小時），在低於25℃之環境下給予病患。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ8180201

學名：Docetaxel

商品名：taxotere ★ 20mg/1ml (低劑量)

中文名：剋癌易注射劑



2. 對於應避免或忌用酒精之病人，或合併使用其他藥品治療之病人，醫療人員於處方或使用docetaxel 成分藥品時，應考慮該藥品所含之酒精含量，並告知docetaxel 產品內所含的酒精成分可能會引發之酒醉症狀。
3. 輸注該藥品後1~2 小時內，應避免開車、操作機械或從事其他危險活動。
4. 某些藥品（例如止痛藥和安眠藥）可能會與docetaxel 產品內所含的酒精產生交互作用，加劇酒精中毒之效應。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

嗜中性白血球缺乏、骨髓抑制、掉髮、虛弱、噁心、嘔吐、口腔炎、腹瀉、指甲病變。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 儲存溫度不可高於25℃。
2. 請儲存於原有包裝以避免光照。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師