用藥指導單張

衛教小組 DN9630101

學　名：Doripenem

商品名：FINIBAX 250MG

中文名：伏霸注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對Doripenem Hydrate具感受性之菌種的複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎炎)及複雜性腹腔內感染。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
18歲以上成人，每8小時點滴靜注500mg，每次注射時間請超過 1小時。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 以生理食鹽水泡製之注射液於室溫下維持安定的時間為12小時。於2-8℃下維持安定的時間為24小時。

2. 以5%葡萄糖液泡製之注射液於室溫下維持安定的時間為4小時。於2-8℃下維持安定的時間為24小時。

所製備的懸浮液或注射液不可冷凍。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

大部分常見的不良反應為頭痛、噁心、腹瀉、發疹及 靜脈炎。

六、此藥儲存時的條件為何？

Finibax應置於 25℃ 之環境中。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26