用藥指導單張

衛教小組 DA15190101

學　名：Alirocumab

商品名：PRALUENT 75MG(健保事審)

中文名：保脂通注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

預防心血管事件

對於已確診心血管疾病的成年病人，Praluent可用於降低心肌梗塞、中風以及需住院治療的不穩定心絞痛之風險。

原發性高血脂症（包含異合子家族性高膽固醇血症）

Praluent可單獨使用或併用其他降血脂藥物（例如：Statin類藥物、ezetimibe），作為飲食外的輔助治療以降低原發性高血脂症成年病人之低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
在開始Praluent治療前，應先排除高血脂症或混合型血脂異常之次要病因（例如，腎病症候群、甲狀腺功能低下）。

Praluent的建議起始劑量為75毫克，每2週一次，或300mg每4週(每月)一次，以皮下注射給藥。

多數的病人在此劑量下能使低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)充分下降。若LDL-C的反應不如預期，則可調整至最高劑量150毫克，每2週皮下注射一次。給藥方式皮下注射使用。

Praluent可皮下注射於大腿、腹部或上臂。 當給予300mg劑量時，應以150mg兩次劑量連續施打於兩個不同注射部位。

三、使用時我該注意的特別事項？

過敏反應

全身性過敏反應包括搔癢，以及罕見但有時嚴重的過敏反應如過敏、錢幣狀濕疹、蕁麻疹及過敏性血管炎，這些都曾在臨床試驗中被報告過。在上市後使用情況曾有血管性水腫報告。若有嚴重過敏反應之徵兆或症狀出現，Praluent應停用並給予適當的症狀性治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

局部注射部位反應、上呼吸道徵兆與症狀，以及搔癢。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02

用藥指導單張

衛教小組 DA15190101

學　名：Alirocumab

商品名：PRALUENT 75MG(健保事審)

中文名：保脂通注射劑



六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於冰箱（2° C-8° C)。不可冷凍。

從冰箱拿出後置放於25° C以下的時間最多不得超過30天。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02