用藥指導單張

衛教小組 DQ12270101

學　名：Torsemide

商品名：torsix（口服）5mg

中文名：妥速適錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療鬱血性心臟衰竭、腎疾病、肝臟疾病及慢性腎衰竭所引發的水腫症狀，高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 一般情況：

(1) 只要方便Torsemide 並不限定在餐前或餐後服用。

(2) 老年患者毋需特別調整劑量。

(3) 由於Torsemide 之高生體可用率，口服及靜脈注射的治療劑量皆相等，故患者可就這兩種給藥方式互相交換而不必改變劑量。

2. 鬱血性心臟衰竭：一般起始劑量為每日一次，每次10mg 或20mg。如果利尿效果不佳，劑量可以大約雙倍量的方式增加，調整至可產生適當之利尿效果的劑量，但單次超過200mg 之劑量尚無足夠研究支持使用。 3. 慢性腎衰竭：一般起始劑量為每日一次，每次20mg。如果利尿效果不佳，劑量可以大約雙倍量的方式增加，調整至可產生適當之利尿效果的劑量，但單次超過200mg 之劑量尚無足夠研究支持使用。

4. 肝硬化：一般起始劑量為每日一次，每次5mg 或10mg，並且和aldosterone 拮抗劑或保鉀利尿劑併用。如果利尿效果不佳，劑量可以大約雙倍量的方式增加，調整至可產生適當之利尿效果的劑量，但單次超過40mg 之劑量尚無足夠研究支持使用。至今尚無適當與設計優良的臨床研究報告來支持肝臟疾病患者長期使用任何利尿劑。

5. 高血壓：一般起始劑量為每日一次，每次5mg，若於4 至6 週內無法有效降低血壓，則劑量增為每日一次，每次10mg。若10mg 之劑量仍無效，則需於治療藥物中加入其他降血壓藥物。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DQ12270101

學　名：Torsemide

商品名：torsix（口服）5mg

中文名：妥速適錠



五、此藥會造成什麼副作用？

頭暈、頭痛、噁心、衰弱、嘔吐、高血糖、尿液過多、高尿酸血症、低血鉀症、過渴症、低血容量、陽痿、食道出血及消化不良。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於室溫 25℃。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15