用藥指導單張

衛教小組 DF0410101

學　名：Celecoxib

商品名：CELEBREX 200MG

中文名：希樂葆膠囊200公絲



一、此藥品的用途是什麼？

緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 應使用最低有效劑量。本品最大使用劑量每日不可超過400mg。
2. 骨關節炎：解除骨關節炎病徵及症狀的推薦劑量為每天200mg，單次服用；以100mg每天二次的方式給藥亦可。
3. 類風濕性關節炎：解除類風濕性關節炎病徵及症狀的推薦劑量為每天100至200mg，每天二次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有些服用本品的患者曾經出現液體滯留與水腫。因此，本品用於具有液體滯溜、高血壓或心衰竭的患者應小心。
2. 氣喘患者可能會有aspirin過敏性氣喘。具有aspirin過敏性氣喘之患者，使用aspirin曾經伴隨可能致死的嚴重支氣管痙攣。由於在這種aspirin過敏性氣喘患者中，曾經有aspirin和其他非類固醇消炎藥之交叉反應性的報告，包括支氣管痙攣在內。所以這種類型的aspirin過敏患者不可使用本品，而原先已有氣喘之患者使用時應小心。
3. 本品可能會引起不適，而且很少引起會導致住院，甚至於死亡的嚴重副作用，例如胃腸出血等。雖然嚴重的胃腸潰瘍及出血可能沒有警告症狀，患者仍應留意潰瘍及出血的徵兆和症狀。如果發現任何徵兆或症狀，即應就醫診治。
4. 如果出現胃腸潰瘍或出血的徵兆或症狀、皮疹、原因不明的體重增加或水腫，應立即告知醫師。
5. 患者應得知肝毒性的警告徵兆及症狀（如噁心、疲倦、嗜眠、搔癢、黃疸、右上腹壓痛、及類似「感冒」的症狀）。如果出現這些徵兆及症狀，應指示患者停藥，並立即就醫。
6. 懷孕後期應避免服用本品，因為它可能會引起動脈導管的早期癒

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09

用藥指導單張

學　名：Celecoxib

商品名：CELEBREX 200MG

中文名：希樂葆膠囊200公絲



合。

7. 勿合併類固醇、抗凝血劑、利尿劑、ACEI、有交互作用的藥品及二種以上的 NSAIDs。

8. 心血管疾病等高危險群病人，使用本品宜小心。

9. 提醒醫療人員如果病患使用Celebrex可能會增加其心血管方面疾病發生的危險性。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

偶有腹痛、腹瀉、消化不良、脹氣、噁心、背痛，週邊水腫，頭暈、頭痛、失眠、咽炎、竇炎、上呼吸道感染、皮疹等不良反應，其發生率都比一般NSAID來得低。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25° C。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09