用藥指導單張

衛教小組 DD5270301

學　名：Domperidone 1mg/ml

商品名：WEMPTY SUSP. 1MG/ML, 60ML

中文名：胃利空懸液劑



一、此藥品的用途是什麼？

噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本藥須由醫師處方使用

如需服用此藥，建議飯前及睡前15-30分鐘服用此藥。

成人及青少年（大於12歲且體重超過35公斤）：一天3-4次，一次10mg。

小兒：一天1-2mg/kg，分三次於飯前使用，可視年齡、體重、症狀適宜增減。

小兒一天投與量不可超過30mg。6歲以上，一天最高劑量1mg/kg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 哺乳期間的使用－使用最高建議劑量時，預期會排泄到人體乳汁的 domperidone 總量每天不超過 7μg。不清楚這對新生兒是否有害。因此，正在服用 domperidone 的母親不建議哺乳。

2. 使用於嬰兒－罕見神經學副作用。由於初生第一個月內其代謝及血腦障壁功能尚未發育完全，幼童發生神經學副作用的危險性較高。因此，建議要精確地決定新生兒、幼童及兒童的使用劑量，並嚴格執行。過量可能會對兒童造成神經學副作用，但其它原因亦須納入考量。

3. 使用於肝功能異常患者－由於 domperidone 主要由肝臟代謝，肝臟受損病人使用 domperidone 應小心。如果肝機能惡化，出現黃疸伴隨 ASP（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP 值上升，應充分進行觀察，應考慮停藥並做適當處置。

4. 使用於腎功能異常患者－嚴重腎功能不全時(血中肌酸酐>6mg/100ml,即>0.6m mol/l)，domperidone 之排除半衰期由 7.4 小時提高至 20.8 小時，但其血中藥物濃度較健康受試者低。由於經由腎臟排泄之原型藥極少，腎功能不全患者尚不需調整單次急性投與之劑量。然而，重覆給藥時應視腎臟受損之嚴重程度將服藥次數降低為每天一至二次，劑量並應酌量降低。此類病人若接受長期治療應定期檢查。 5. 服用前請先振盪均勻。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DD5270301

學　名：Domperidone 1mg/ml

商品名：WEMPTY SUSP. 1MG/ML, 60ML

中文名：胃利空懸液劑



四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

本藥不良反應很少，偶有口乾、口渴、暫時性皮疹或搔癢、頭痛、腸胃不適、腹瀉、嗜睡等。罕見泌乳激素濃度升高、男性女乳症。

六、此藥儲存時的條件為何？

(1)本品應置於兒童不及之處。

(2)請密封貯存於 25℃以下，請勿冰存並避免陽光直射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20