用藥指導單張

衛教小組 DC1230101

學　名：Levetiracetam

商品名：KEPPRA(口服) 500MG

中文名：優閒膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

十六歲以上病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。

四歲以上孩童或成人病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作，以及十六歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 本藥為口服膜衣錠，服用時以足量水伴服吞入，飯前或飯後均可。建議每日劑量平均分早、晚兩次使用。
2. 成人及十六歲以上青少年：初始劑量每日1000公絲(每日兩次，每次500公絲)。此劑量可始於治療的第1天。
3. 視病人的臨床反應及耐受性，每日劑量可增加到最高每日3000公絲(分兩次，每次1500公絲)。當欲改變劑量時，應以每二至四星期增量或減量1000公絲(每日分兩次，每次增/減500公絲)為一階段進行。
4. 對輕度及中度肝功能障礙的患者，投與劑量毋需調整。但對嚴重肝功能障礙患者，應先監測creatinine clearance確定

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 依據臨床經驗，若服用Keppra後又必須停藥時，建議分階段性減量，例如：每二至四星期減量1000公絲(當日分二次，每次各減500公絲)。
2. 腎臟功能障礙患者使用時，必須調整劑量。對嚴重肝臟功能障礙的患者，在決定投與劑量前，應先評估其腎臟功能。
3. 食物不會改變levetiracetam在體內的吸收程度，但吸收速率會稍微減緩。Levetiracetam會排泄至乳汁中。由於授乳婦服用本藥有可能會使嬰兒產生嚴重不良反應，因此必須考量本藥對患者的重要性而決定是否應停止授乳或應停藥。
4. 有此患者在治療初期或增加劑量時，可能會引起睏倦或其他與中

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25

用藥指導單張

衛教小組 DC1230101

學　名：Levetiracetam

商品名：KEPPRA(口服) 500MG

中文名：優閒膜衣錠



樞神經系統有關的徵狀。因此，當患者在執行開車或操作機械等技術性工作時，需小時謹慎。

5. Keppra過量時會有嗜睡、精神激昂、具攻擊性等現象。處置：當急性過量時，可洗胃或催吐。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 較常見的副作用為嗜睡及無力感。
2. 神經系統：眩暈、抽搐、頭痛、運動失調、震顫、失憶。
3. 精神系統：行為異常、具攻擊性、易怒、焦慮、混亂、抑鬱、情緒不穩定、幻覺、具敵意、失眠、敏感、神經質、神經及經神障礙。
4. 消化道：噁心、消化不良、腹瀉、厭食。
5. 營養障礙：厭食；耳部及迷走障礙：眩暈。
6. 損傷：意外事故損傷。
7. 皮膚：潮紅；眼睛：複視。
8. 血液障礙：紅血球、白血球或血小板數目減少。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25