


用藥指導單張

衛教小組 DC3770201

學名：Imipramine

商品名：imipramine(tone) 10mg

中文名：靜安膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

憂鬱病、夜尿。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

憂鬱病：

用法及給藥方式因人而異，且須依並人情況作調整。原則上，儘可能用最低有效劑量，且要小心地增加劑量，特別是老年人或青少年的治療，使用Imipramine治療期間，須嚴密監測病人，以確定此藥的療效及病人耐受性。

住院患者：

初劑量為每日100mg，分次服用；必要時可逐漸增至每日200mg。二週後若無明顯改善則增至每日250-300mg。

門診患者：

初劑量為每日75mg，可增至每日150mg，每日劑量不得超過200mg，維持劑量為每日50-150mg。

青少年及老人：

初劑量每日30-40mg，每日不可超過100mg。

兒童夜尿：

6歲以上兒童之初劑量為每日25mg，睡前1小時服用，一週內若無明顯療效則一下列劑量投與：12歲以下：每晚服用50mg。12歲以上：每晚服用75mg。服用75mg以上之劑量並不會提高療效。對於入睡不久即尿床的小孩要在晚餐前給與部份劑量。每日劑量不可超過2.5mg/kg。

本藥對於6歲以下夜尿症兒童之有效性及安全性尚未確立。

三、使用時我該注意的特別事項？

下列患者應審慎投與本藥：

- 有心血管功能不全的病人、房室阻斷、心律不整、鬱血性心臟衰竭、心肌梗塞、中風及心跳過速。
- 有狹角性青光眼的病人。
- 因尿液流動受阻而排尿異常的病人。（如有攝護腺疾病的病人）
- 低抽搐閾值的病人。
- 有嚴重肝臟或腎臟疾病的病人。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DC3770201

學名：Imipramine

商品名：imipramine(tone) 10mg

中文名：靜安膜衣錠



四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

疲倦、體重增加、頭暈、便秘、口乾。

六、此藥儲存時的條件為何？

避潮避熱，30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師