
用藥指導單張

衛教小組 DM16600101

學　名：Tocilizumab

商品名：actemra (INFUSION) 80mg/4ml/vial(健保事審)

中文名：安挺樂靜脈點滴注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 類風濕性關節炎(RA)
2. 類風濕性關節炎(RA) - 未曾使用MTX治療的RA
3. 多關節性幼年型原發性關節炎(PJIA)
4. 全身性幼年型原發性關節炎(SJIA)
5. 細胞激素釋放症候群(CRS)
6. 新型冠狀病毒疾病(COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎)

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

類風濕性關節炎

Actemra可單獨給藥，或與methotrexate合併使用。成人的建議劑量為每4週給藥一次，以60分鐘單次靜脈滴注投予，起始劑量為4 mg/kg，然後視臨床反應調整為8 mg/kg。

多關節性幼年型原發性關節炎

Actemra可單獨使用，亦可與methotrexate合併使用。對PJIA病人每4週一次，以60分鐘單次靜脈滴注之方式使用Actemra治療時的建議劑量為：PJIA病人每4週一次靜脈給藥之建議劑量：體重低於30公斤的病人10 mg/kg，體重達30公斤以上的病人8 mg/kg

全身性幼年型原發性關節炎

Actemra可單獨使用，亦可與methotrexate合併使用。對SJIA病人每2週一次以60分鐘單次靜脈滴注之方式使用Actemra治療時的建議劑量為：SJIA病人每2週一次靜脈給藥之建議劑量：體重低於30公斤的病人12 mg/kg，體重達30公斤以上的病人8 mg/kg。

細胞激素釋放症候群(CRS)

用於治療CRS時，僅可採用靜脈途徑給藥。對CRS病人以60分鐘靜脈輸注之方式使用Actemra治療時的建議劑量為：　CRS病人靜脈給藥之建議劑量：體重低於30公斤的病人 12 mg/kg 體重達30公斤以上的病人 8 mg/kg。

新型冠狀病毒疾病(COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎)

COVID-19成年病人以單次60分鐘靜脈輸注之方式使用Actemra，治療時的建議劑量

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20


用藥指導單張

衛教小組 DM16600101

學　名：Tocilizumab

商品名：actemra (INFUSION) 80mg/4ml/vial(健保事審)

中文名：安挺樂靜脈點滴注射劑



為8 mg/kg；單次輸注的劑量不建議超過800毫克。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

上呼吸道感染、鼻咽炎、頭痛、高血壓及ALT上升。

六、此藥儲存時的條件為何？

Actemra必須儲存於2至8°C，請勿冷凍保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20