

用藥指導單張

衛教小組 DC5040201

學名：Levetiracetam

商品名：KEPPRA(液劑) ORAL SOL'N 100MG/ML, 300ML

中文名：優閒內服液劑



一、此藥品的用途是什麼？

十六歲以上病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。四歲以上孩童及成人病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作，以及十六歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 本藥可與水併服，飯前或飯後均可。建議每日劑量平均分早、晚兩次服用。
2. 成人及十六歲以上的青少年：每天2次每次250mg開始，兩星期後增加劑量到每天兩次每次500mg達起始治療劑量。
3. 成人（十八歲以上）及體重五十公斤以上的青少年（十二到十七歲）：初始劑量為每日1000mg(每日兩次每次500mg)。視病人的臨床反應及耐受性，每日劑量可增加到最高每日3000mg(分兩次，每次1500mg)。
4. 六十五歲以上的老年人患者：腎功能障礙的老年患者，需調整其劑量。
5. 孩童（四歲至十一歲）及體重五十公斤以下的青少年（十二到十七歲）：依體重計算，初始劑量為每天兩次，每次10mg/kg。視病人的臨床反應及耐受性，每日劑量可增加到最高每日30mg/kg，每日兩次。
6. 嬰兒及四歲以下孩童：不建議使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 腎功能障礙患者使用時，必須調整劑量。對嚴重肝功能障礙的患者，在決定投予劑量前，應先評估其腎臟功能。
2. 本藥也含有maltitol，患有罕見遺傳性果糖不耐受症的病人請勿使用本藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

無力感、嗜睡、暈眩、震顫、厭食、嘔吐

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 25°C以下原瓶保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC5040201

學名：Levetiracetam

商品名：KEPPRA(液劑) ORAL SOL'N 100MG/ML, 300ML

中文名：優閒內服液劑



2. 開封後，有效期為兩個月。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師