用藥指導單張

衛教小組 DM8880201

學　名：Sodium chloride

商品名：SODIUM CHLORIDE(ISOTONIC) 0.9% 500ML

中文名：生理食鹽水注射液



一、此藥品的用途是什麼？

水分補給。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
(按病人情況及製劑而使用)

1. 0.9%溶液—24小時1.5～3公升。
2. 0.45%溶液—24小時2～4公升。
3. 3%或5%溶液—最多為100ml，滴注1小時以上。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 監視攝入一輸出的比率及血中電解質。
2. 無代償能力的心臟血管或腎臟病及接受Corticosteroids的病人，要小心使用。
3. 滴注較高張濃度的溶液要很慢，以防止肺水腫。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

大量急速投與可能產生血清電解質異常、鬱血性心不全、浮腫及酸中毒等副作用。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15