

用藥指導單張

衛教小組 DD15300101

學名：Metoclopramide

商品名：IMPERAN INJ 10MG 2ML

中文名：英百朗注射液



一、此藥品的用途是什麼？

預防嘔吐，逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：通常1天1次，1次2mL，肌 或靜脈內注射。

兒童：通常1天1次，1次0.5-2mL，肌 或靜脈內注射，依年齡、體重、症狀適宜增減之。

1歲以下嬰兒：單 劑量每公 體重 0.1毫克 (0.1mg/kg/dose)，最多每天 次。

兒童回量依下表投與更 便：

年齡(未滿)

1歲

2歲

5歲

10歲

15歲

一回量

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD15300101

學名：Metoclopramide

商品名：IMPERAN INJ 10MG 2ML

中文名：英百朗注射液



0.1mg/kg

0.5mL

0.3mg/kg

0.7mL

0.25mg/kg

1.0mL

0.2mg/kg

1.5mL

0.2mg/kg

三、使用時我該注意的特別事項？

有極少數兒童使用本藥可能發生嗜眠或輕微的肌肉緊張，此為暫時性現象，停止用藥並保持安靜等候症狀之消失即可。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

使用含Metoclopramide 成份藥品可能造成遲發性運動障礙，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量有正相關性，且分析本品之使用型態，約20%病人使用超過12週，故不建議長期(超過12週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生tardive dyskinesia 之風險者。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師