用藥指導單張

衛教小組

學　名：Verapamil

商品名：ISOPTIN SR 240MG

中文名：心舒平持續性膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
與食物同服。一般劑量為每日120-240mg，於早上服用，依投藥8小時後的反應調整劑量。

由錠劑轉換成緩釋劑型時可使用同等劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、 有下列情況時，須小心使用：

1. 第一級房室阻斷 (First degree AV block)
2. 低血壓
3. 心搏徐緩 (Bradycardia)
4. 重度肝功能不全： 由於verapamil hydrochloride在肝臟有很高的代謝作用，因此肝功能不全的病人要小心投與。重度的肝功能不全將會延長本品的排除半衰期至14-16小時。所以投與肝功能不全患者的劑量 只能為一般正常劑量的30%。
5. 腎功能不全： 大約有70%投與藥物的代謝產物由尿液排除，因此要小心服用。
6. 患有影響神經肌肉傳導之疾病 (重症肌無力、Lambert-Eaton 症候群、嚴重Duchenne型肌萎縮)

二、 患有複雜之心肌梗塞及心臟性休克者須慎重給藥及嚴加監督。

三、 有腦血管病變，心臟阻礙及高血壓患者使用verapamil或提高劑量時，須特別小心。

四、 偶有便秘、厭食、噁心等胃腸症狀，眩暈、搖晃感等低血壓症狀。

五、 Verapamil並不能阻止急性狹心症發作。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組

學　名：Verapamil

商品名：ISOPTIN SR 240MG

中文名：心舒平持續性膜衣錠



的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、眩暈、噁心、便祕和腹痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20