用藥指導單張

衛教小組 DA15590101

學　名：bempedoic acid

商品名：NILEMDO F.C.TAB 180MG(自費)

中文名：寧脂德膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

適用於患有異合子家族性和非家族性之原發性高膽固醇血症、或混合型血脂異常的成人病人，作為飲食的輔助治療以降低低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)：

- 與statin類藥品併用、或併用於statin合併其他降血脂療法，治療已接受最大耐受劑量statin仍無法達到低密度脂蛋白膽固醇目標值的病人，或，
- 單獨或與其他降血脂療法併用，治療無法耐受statin或禁用statin的病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量

Nilemdo的建議劑量為每　　服　次180mg膜衣錠，每次　錠。

與simvastatin療法併

Nilemdo與simvastatin併用時，simvastatin的劑量應限制在每日20mg（對於患有嚴重　膽固醇　症和　血管併發症　風險的病　，其使用較低劑量而未能達到治療目標，且預期效益　於潛在風險時，simvastatin的劑量應限制為每天40mg)。

施用　式隨餐或空腹　服使用膜衣錠。應吞服整顆錠劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

高尿酸血症、四肢疼痛和貧血。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30°C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02