

# 用藥指導單張

衛教小組 DQ0740101

學名：Enzalutamide

商品名：XTANDI ★ 40MG (需事審)

中文名：安可坦軟膠囊



## 一、此藥品的用途是什麼？

治療

(1) 藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀而不須使用化學治療者。

(2) 藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌且已接受過 docetaxel 治療者。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

建議劑量為口服 enzalutamide 160mg (4 粒 40mg 膠囊) 每天一次。對非手術去勢的病患，應持續以 LHRH 類似物做藥物去勢治療。

Xtandi 口服使用。膠囊應以水整粒吞服，可隨餐或空腹服用。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的不良反應為無力/疲勞、熱潮紅、頭痛和高血壓。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師