
用藥指導單張

衛教小組 DM7040301

學　名：Abatacept

商品名：ORENCIA 250MG(健保事審)

中文名：恩瑞舒凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 類風濕性關節炎：

Orencia與methotrexate併用，用於治療罹患有中度至重度活動性類風濕性關節炎且對其他疾病修飾抗風濕病藥物[包括methotrexate (MTX)或一種腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑]反應不良或耐受性不佳的成人患者。

2. 幼年型慢性關節炎：

Orencia與methotrexate併用，用於治療罹患有中度至重度幼年型慢性關節炎且對其他疾病修飾抗風濕病藥物[包括一種腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑]反應不良或耐受性不佳的6歲或6歲以上兒童患者。
**Orencia未於6歲以下的兒童進行任何研究。

3. 重要用藥限制：

Orencia不可與其他治療類風濕性關節炎(RA)的生物製劑同時使用。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人：
仿單上之建議劑量以持續30分鐘靜脈輸注方式治療。開始給藥後，Orencia應在第一次輸注後的第2及4週後給藥，此後每4週給藥一次。
老年人：
不需調整劑量。
小兒病患：
幼年型慢性關節炎：對於6至17歲且體重未達75 kg的幼年型慢性關節炎患者，Orencia的建議劑量為10 mg/kg，並於每次投藥根據病患體重計算劑量。兒童病患的體重達到75 kg或以上時，則按照成人劑量處方給藥，但最大劑量不能超過1000 mg。投予時須採靜脈輸注方式持續30分鐘。開始給藥後，Orencia應在第一次輸注後的第2及4週後給藥，此後每4週給藥一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 建議用藥前之篩檢與用藥後之追蹤除Tuberculin skin test 外，

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20


用藥指導單張

衛教小組 DM7040301

學　名：Abatacept

商品名：ORENCIA 250MG(健保事審)

中文名：恩瑞舒凍晶注射劑



應再納入QuantiFERON test；另tuberculin skin test 結果應下修至以≧5mm 者為陽性，陽性者應接受胸部X光、痰液acid fast stain及分枝桿菌培養等測試。

2. 所有接受本品治療患者，應每半年執行一次胸部X光及QuantiFERON test；若發現有陽性等情況發生，即應依前述規範執行風險管控。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、上呼吸道感染、鼻咽炎與噁心。

六、此藥儲存時的條件為何？

2° C至8° C冷藏保存。超過有效期限的產品請勿使用。保存在原始包裝內避光，直到使用時為止。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20