

用藥指導單張

衛教小組 DB5720301

學名：Fluticasone+Vilanterol

商品名：RELVAR ELLIPTA INH 92/22 MCG 30DOSE

中文名：潤娃易利達乾粉吸入劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 慢性阻塞性肺病的維持治療：

慢性阻塞性肺病(COPD)患者之氣道阻塞症狀的維持治療。降低有惡化病史患者之COPD惡化。

2. 氣喘的治療：

治療適合使用吸入型皮質類固醇及長效 β 2作用劑合併治療的18歲及以上氣喘患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

RELVAR ELLIPTA 92 mcg/22 mcg (遞送劑量)應以每天吸入一次的方式投藥，且僅可經口吸入。吸入之後，患者應用水漱口，且不可吞下，這是為了幫助降低發生口咽念珠菌病的風險。

RELVAR ELLIPTA應每天於相同時間投藥。每24小時不可使用RELVAR ELLIPTA超過1次。

慢性阻塞性肺病

RELVAR ELLIPTA 92/22應以每天吸入一次的方式投藥。最大建議劑量為RELVAR ELLIPTA 92/22 mcg (遞送劑量)每天吸入一次(只有該劑量適合用於治療COPD)。

氣喘

建議起始劑量是RELVAR ELLIPTA 92/22或RELVAR ELLIPTA184/22每次吸入一單位劑量，每天一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

對病情正在快速惡化或發生可能危及生命之發作事件的COPD患者，不可開始使用本品。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB5720301

學名：Fluticasone+Vilanterol

商品名：RELVAR ELLIPTA INH 92/22 MCG 30DOSE

中文名：潤娃易利達乾粉吸入劑

咽炎，鼻竇炎，上呼吸道感染。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30℃ 以下。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師