用藥指導單張

衛教小組 DM13530101

學　名：Meropenem

商品名：MEXOPEM INJ 1G(高劑量)

中文名：美樂平乾粉注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對Meropenem具有感受性之細菌引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
依文獻記載，本藥限由醫師使用。使用本品時，給藥開始後第三天應判斷是否必要繼續給藥、停藥或改用更適宜的其它藥物。本品的使用期間以14 天為原則。

成人

一般用量為1天0.5~1g Meropenem(效價)，分2~3次投與，經30分鐘以上靜脈點滴注射。根據年齡和症狀，可調整劑量，對於危重患者或是難治性感染患者，每天劑量可增至2g(效價)。

兒童患者

一般用量為一天30~60mg(效價)/kg，分3次投與，經30分鐘以上靜脈點滴注 射。根據年齡和症狀，可調整劑量，對於危重患者或是難治性感染患者，每 天劑量可增至 120mg(效價)/kg。但是不能超過成人的一天最大劑量2g。

【靜脈點滴注射液的配製】依文獻記載，通常0.25g(效價)、0.5g(效價)及1.0g(效價)用 100mL以上之生理食鹽水等溶解使用。注射用水則不得使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、慎重給藥(對下列病人應慎重給藥)：依文獻記載，

(1)對Carbapenem類、Penicillin類或 Cephem類抗生素有過敏史的病人。

(2)本人或父母、兄弟姊妹為易於引起支氣管哮喘、皮疹、蕁麻疹等反應體質的病人。

(3)嚴重腎功能障礙的病人，易引起痙攣，意識障礙等中樞神經系統症狀。

(4)嚴重肝功能障礙的病人。

(5)老年人。

(6)進食不良的病人或非經口投與營養注射劑的病人，全身狀況不 良的病人。

(7)曾有癲癇病史者或中樞神經障礙患者，易引起痙攣、意識障礙等中樞神經症狀。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26

用藥指導單張

衛教小組 DM13530101

學　名：Meropenem

商品名：MEXOPEM INJ 1G(高劑量)

中文名：美樂平乾粉注射劑



二、重要注意事項：依文獻記載，

(1)可能引起過敏性休克，應充分問診。給藥前宜先進行 skin test。 (2)包括實行skin test時，做好搶救過敏性休克的準備。給藥後使病人保持安靜狀態，且密切觀察。

(3)給藥後第3天至第5天應特別注意觀察皮疹等不良反應。出現不良反應時，應採取改用其它藥物等適當措施。連續給藥時，也應隨時觀察不良反應。

(4)使用本品前未能確定細菌敏感時，應在給藥開始後第3天確定敏感性後，判斷使用本品是否適當。當細菌對本品不敏感時，應立即改用其他適合之藥物。

(5)根據病人狀況，在不得已的情況下未確認病原菌便開始使用本品時，若於數天內病人狀況未好轉，應改用其他藥物等適當措施。連續給藥時，也應隨時觀察症狀好轉情況，不得隨意長期給藥。

(6)根據病人狀況需連續使用本品7天以上時，應明確判斷長期給藥的理由，且密切觀察是否皮疹及肝功能異常等副作用。使用本品不得隨意連續給藥。

(7)因有時出現 GOT、GPT升高，故連續給藥一週以上時，應進行肝功能檢查。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

皮疹、腹瀉和軟便、噁心、嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

請貯存於25℃以下陰涼處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26