


用藥指導單張

衛教小組 DR11860101

學名：Glycopyrrolate

商品名：GLYCOPYRODYN INJ 0.2MG/ML

中文名：格比平注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

手術前或手術中用以減少唾液、支氣管、咽囊分泌物，和胃分泌之游離酸；麻醉或插管治療時用以阻斷心臟迷走神經反射作用、消化性潰瘍之輔助治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本品可不經稀釋，直接肌肉或靜脈注射給藥。

成人：

麻醉前給藥— 本品建議劑量為每磅體重 0.002 毫克 (0.01 毫升) 肌肉注射，在麻醉開始前30-60 分鐘給藥，或是與麻醉前麻醉劑和鎮靜劑同時給藥。

手術中給藥— 本品可在手術中給藥，以拮抗由藥物引發或迷走神經反射相關的心律不整，例如心搏徐緩。其給藥方式應經由靜脈注射給藥，一次劑量0.1 毫克(0.5 毫升)，必要時每2-3 分鐘重複給藥。例行的評量必須執行，以確定造成心律不整的原因；同時，為了導正副交感神經不平衡問題而做的手術或麻醉操作也必須被執行。

神經肌肉阻斷之回復— 本品建議劑量為每1.0 毫克neostigmine或5.0 毫克pyridostigmine 使用0.2 毫克(1.0 毫升)本品。為了將心臟方面的副作用之出現機率降到最低，這些藥可同時經由靜脈注射給藥，也可以混合在同一個注射針筒中。

孩童：

麻醉前給藥—

本品建議劑量為一個月到十二歲大的小孩，每磅體重0.002 毫克(0.01 毫升)肌肉注射，在麻醉開始前30-60 分鐘給藥，或是與麻醉前麻醉劑和鎮靜劑同時給藥。一個月到兩歲大的小孩可能需要增加到每磅體重0.004 毫克(0.02毫升)。

手術中給藥—

因為當本品用在麻醉前給藥時的藥效持續很久，因此手術中為了抗膽素激性效果而再追加注射本品的機會是很少的；如果真的需要時，兒童的建議劑量是每磅體重

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DR11860101

學名：Glycopyrrolate

商品名：GLYCOPYRODYN INJ 0.2MG/ML

中文名：格比平注射劑



0.002毫克(0.01 毫升)靜脈注射，一次劑量不要超過0.1毫克(0.5毫升)，必要時每2-3分鐘重複給藥。例行的評量必須執行，以確定造成心律不整的原因；同時，為了導正副交感神經不平衡問題而做的手術或麻醉操作也必須被執行。

神經肌肉阻斷之回復—

本品兒童的建議劑量為每1.0毫克neostigmine或5.0毫克pyridostigmine使用0.2毫克(1.0毫升)本品。為了將心臟方面的副作用之出現機率降到最低，這些藥可同時經由靜脈注射給藥，也可以混合在同一個注射針筒中。

三、使用時我該注意的特別事項？

使用本品前需先調查病人是否有任何心搏過速現象，因為使用本品後心跳速率增加是可能發生的。對以下病人使用時要特別小心：冠狀動脈疾病、充血性心衰竭、心律不整、高血壓、甲狀腺機能亢進。若是用來治療潰瘍，對於年長者和有自主神經疾病，或是肝腎疾病、潰瘍性結腸炎、裂孔赫尼亞的病人都需要特別小心注意，因為抗膽素激性藥物會加重以上這些疾病。如果使用過量，類似箭毒作用的反應可能會發生。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

口乾、排尿困難和滯留。

六、此藥儲存時的條件為何？

應存放於 25° C 以下之室溫中，避免陽光直接照射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師