

用藥指導單張

衛教小組 DC11700201

學名：Levetiracetam

商品名：NOBELIN XR F.C. TAB 500MG

中文名：意必寧持續性釋放膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療 12 歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

初始劑量為每日一次1000 毫克。每日最大劑量為3000 毫克。本藥品不得剝半和磨碎使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 使用任何抗癲癇藥物治療疾病時，必須監測患者是否有憂鬱症狀的出現或惡化、自殺意念或行為及/或任何不正常的情緒或行為改變。
2. 腎臟功能障礙患者使用時，必須調整劑量。對嚴重肝臟功能障礙的患者，在決定投與劑量前，應先評估其腎臟功能。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

嗜睡、暈眩、躁動不安、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師