

用藥指導單張

衛教小組 DH14530101

學名：Triptorelin

商品名：DIPHERELINE P.R. ★ 11.25MG(自費)(高劑量)

中文名：達菲林長效注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

攝護腺癌以及子宮內膜異位症之輔助治療。

治療中樞性早熟症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

投與途徑：肌肉內注射。

攝護腺癌每3 個月肌肉內注射本品乙劑。

子宮內膜異位症之輔助治療。每3 個月肌肉內注射本品乙劑。於月經週期開始之第五天開始治療。治療期間：依起始治療之子宮內膜異位之嚴重程度及治療期間所觀察到之臨床特徵(功能及解剖)改變而定。原則上，子宮內膜異位之治療期至少3 個月，最多6 個月。於第二次療程並不建議使用triptorelin 或其他天然促性腺激素釋放激素的類似物。使用此長效釋放製劑必須嚴格遵照仿單 " 使用說明 " 的指示執行注射。任何不完全的注射導致殘留在注射筒內的懸浮注射液較一般量多時，必須通報不良反應。

中樞性早熟體重 ≥ 20 公斤之中樞性早熟兒童：每3 個月肌肉內注射本品乙劑。治療應在男女青春期的生理年齡時停止，建議當女孩骨齡超過12 歲時治療不繼續。目前有關男孩停止治療的最佳時機資料有限，但建議治療在男孩骨齡13-14 歲時停止。

三、使用時我該注意的特別事項？

使用促性腺激素釋放素促進劑 (GnRH agonists) 可能會造成骨質流失。在男性中，初步資料顯示，雙磷酸鹽類 (bisphosphonate) 與促性腺激素釋放素促進劑 (GnRH agonist) 併用可能減少骨質流失。有骨質疏鬆症風險因子 (例如長期酗酒、吸菸、長期使用抗癲癇劑 (anticonvulsants) 或腎上腺類皮質素 (corticoids) 等減少骨質的藥物、有骨質疏鬆症家族病史、營養不良) 的患者應予以特別注意。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DH14530101

學名：Triptorelin

商品名：DIPHERELINE P.R. ★ 11.25MG(自費)(高劑量)

中文名：達菲林長效注射劑



五、此藥會造成什麼副作用？

熱潮紅、勃起困難及性慾低落。

六、此藥儲存時的條件為何？

請於25° C 以下保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師