用藥指導單張

衛教小組 DM15660101

學　名：Etomidate

商品名：HYPNOMIDATE ★ 20MG/10ML(管藥四)

中文名：怡拓眠注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

靜脈注射麻醉劑。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
供靜脈注射使用。

Hypnomidate須經由靜脈緩慢地注射給藥。

應由熟練氣管插管技術之醫師在可提供心肺復甦設備的情況下使用。 打開安瓿時建議配戴手套。若意外接觸至皮膚，請用清水沖洗接觸部位，避免使用肥皂、酒精或其他可能使皮膚產生物理性或化學性傷害之清洗液。

成人： 在麻醉誘導期，靜脈注射每公斤體重0.3毫克的劑量，可達到持續4至5分鐘的睡眠。

須根據個別病人反應以及臨床作用來調整劑量。

安眠效果可透過額外注射Hypnomidate而延長。

每次手術所給予的劑量不得超過30毫升(3安瓿)。

因Hypnomidate無止痛效果，當進行會產生疼痛之醫療手術時應給予適當的止痛劑，並請參見第7節交互作用所提供之詳細資訊。

三、使用時我該注意的特別事項？

Etomidate對駕駛及操作機械能力有重大影響。儘管病人可能在甦醒後30至60分鐘內恢復正常警覺性，仍建議病人在Hypnomidate給藥後的至少24小時內不要駕車或操作機械。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

運動異動和靜脈疼痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

請勿存放於超過25° C的環境中。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.14