
用藥指導單張

衛教小組 DM16710101

學　名：Etanercept

商品名：ERELZI INJ 50MG/1ML(健保事審)

中文名：爾瑞易注射液



一、此藥品的用途是什麼？

適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物(即DMARDs，包括methotrexate)無適當療效之成人活動性類風濕性關節炎。

適用於先前未使用methotrexate治療之成人中度至重度活動性類風濕性關節炎。這些病人的X光檢查顯示，本品可以減緩疾病造成的關節結構性受損。

適用於methotrexate治療無效或無法耐受的2歲以上兒童及青少年的活動性多關節幼年型慢性關節炎。尚未對不足2歲的兒童進行試驗。

適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物無療效之成人活動性與進行性乾癬性關節炎。

治療活動性僵直性脊椎炎。

適用於對其他全身性治療(包括cyclosporine、methotrexate或光化療法(PUVA))無效、有禁忌或無法耐受之中度至重度乾癬成人病人。

適用於對其他全身性治療或光化療法無法有效控制或無法耐受之6歲以上兒童及青少年的重度乾癬。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人(18-64)歲

類風濕性關節炎

爾瑞易(Erelzi)的建議劑量為每次25毫克，每週二次。亦可以每週給予一次50毫克的方式治療，同樣具有可靠的療效與安全性(見12節)。

乾癬性關節炎與僵直性脊椎炎

爾瑞易(Erelzi)的建議劑量為25毫克，每週二次。也可以每週給予一次50毫克的方式治療。

針對上述所有適應症，現有資料顯示通常會在12週內達到臨床反應。此時間內無反應病人，應審慎考量是否適合繼續治療。

乾癬

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital


用藥指導單張

衛教小組 DM16710101

學　名：Etanercept

商品名：ERELZI INJ 50MG/1ML(健保事審)

中文名：爾瑞易注射液



爾瑞易(Erelzi)的建議劑量為25毫克，每週二次，但亦可每週給予一次50毫克的方式治療。亦可選擇先以每週兩次給予50毫克，持續給予達12週後，再調整為25毫克，每週二次，或每週給予一次50毫克的方式治療。應持續(最多24週)爾瑞易的治療以達到症狀緩解。若病人使用12週後對藥物沒有反應則應停藥。

兒童

爾瑞易(Erelzi)為供單次使用的固定劑量針筒裝注射劑或預充填注射筆，適用於體重62.5公斤或以上的病人。

由於爾瑞易(Erelzi)僅提供25毫克或50毫克預充填注射針筒以及50毫克預充填注射筆的劑型，因此爾瑞易(Erelzi)不適用於所需劑量小於25毫克或50毫克的兒童病人。由於etanercept的兒童建議劑量是以病人的體重計算而得，對於體重不足62.5公斤的兒童病人，應使用凍晶注射劑型的其他etanercept藥品，並以「毫克/公斤」為基礎準確計算投與劑量。

Etanercept對不足2歲之兒童的安全性和療效尚未確立。尚無資料。

活動性多關節幼年型慢性關節炎(2歲以上)

投與0.4毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為25毫克)，每週二次，皮下注射，劑量間之投藥間隔為3-4天；或0.8毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為50毫克)，每週一次。病人在使用四個月後沒反應則應考慮停藥。

針對2到3歲的兒童沒有進行正式的臨床試驗。然而從紀錄中病人有限的安全性資料說明在每週每公斤使用皮下注射0.8毫克的2到3歲兒童之安全性是相似於四歲以上的兒童和成年人。

爾瑞易(Erelzi)並不適用於未滿2歲的活動性多關節幼年型慢性關節炎。

幼年乾癬(6歲以上)

投與0.8毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為50毫克)，每週一次，至多24週。如果病人使用12週後對藥物沒有反應，則應停藥。

如以爾瑞易(Erelzi)再度治療，應遵照上述之用法用量治療。其劑量應為0.8毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為50毫克)，每週一次。

爾瑞易(Erelzi)並不適用於未滿6歲的幼年乾癬。

三、使用時我該注意的特別事項？

感染

在開始接受爾瑞易(Erelzi) 治療前、治療期間及治療後，都應為病人進行感染症的篩選； etanercept的平均排除半衰期約為70小時(範圍為7-300小時不等)。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DM16710101

學　名：Etanercept

商品名：ERELZI INJ 50MG/1ML(健保事審)

中文名：爾瑞易注射液



使用etanercept注射劑曾發生嚴重的感染、敗血症、結核病、或伺機性傳染包括侵入性黴菌感染的疾病、李斯特菌病與退伍軍人症(參見8.1)。這些感染是由細菌、分枝桿菌、黴菌、病毒與寄生蟲(包含原蟲)所引起。在某些案例，某些特殊黴菌與其他伺機感染尚未被診斷出來，而導致延誤治療，有時甚至死亡。在評估病人的感染情況時，亦需考慮病人其他伺機性感染(例如：暴露於地區黴菌病)的風險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位疼痛、腫脹、癢、發紅與流血。

六、此藥儲存時的條件為何？

2°C - 8°C冷藏儲存。不可冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20