用藥指導單張

衛教小組 DA3090101

學　名：Benzylhydrochlorothiazide

商品名：BEHYD 4MG

中文名：泌排特錠



一、此藥品的用途是什麼？

利尿、高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人一天2次，一次1-2錠，視年齡症狀輕重而酌量之。

維持量以一週2~3次間歇投與。

需夜間休息之患者，為避免夜間排尿，請於午前使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 因本劑之利尿效果顯著，從少量開始服用，再徐徐增量。
2. 連續服用時，需定期檢查電解質是否失調。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

(1) 血液：極少例有血小板減少，白血球減少，再生不良性貧血，紫斑等現象出現時，中止使用。

(2) 肝臟：極少例有肝炎出現。

(3) 代謝異常：有低鈉血症，低鉀血症，血中鈣上昇等現象出現，有高尿酸血症，高血糖症出現時應減量或停藥。

(4) 過敏症：有出現斑疹，顏面潮紅或對光線過敏時，應中止使用。

(5) 消化器：偶而出現食慾不振，噁心、嘔吐、胃部不適、下痢、便秘，極少例有胰臟炎、唾液腺炎。

(6) 精神神經系：偶而有眩暈，極少例有知覺異常現象。

(7) 眼：極少例有霧視、黃視症。

(8) 呼吸器：間質性肺炎、肺水腫。

(9) 其他：偶而有倦怠感，極少例有全身性紅斑性狼瘡，肌肉痙攣。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DA3090101

學　名：Benzylhydrochlorothiazide

商品名：BEHYD 4MG

中文名：泌排特錠



藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15