用藥指導單張

衛教小組

學　名：Benralizumab

商品名：FASENRA INJ 30MG/1ML(健保事審)

中文名：肺昇朗注射液劑

需補藥品圖片

一、此藥品的用途是什麼？

FASENRA適用於嗜酸性白血球表現型的嚴重氣喘成人病人，做為附加維持治療。使用限制： • 不適用於治療其他嗜酸性白血球疾病。 • 不適用於緩解急性支氣管痙攣或氣喘重積狀態。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下:
劑量建議劑量如下，前3劑為每4週一次皮下注射30毫克FASENRA，之後每8 週一次。用法應注射於上臂、大腿或腹部，請勿注射在皮膚觸痛、瘀傷、紅斑或變硬的部位。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. FASENRA 不適用於治療氣喘急性發作。 2. 應向患者說明，開始使用後如果氣喘症狀仍控制不良或惡化，則應就醫。 3. 開始使用FASENRA 治療後，不宜驟然停用皮脂類固醇。在合適的情況下，若要減少皮質類固醇劑量，應在醫師監督下逐步調整。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、發熱、咽喉炎、注射部位反應。

六、此藥儲存時的條件為何？

置於冰箱冷藏(2° C 至8° C)

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10