用藥指導單張

衛教小組 DF14210101

學　名：Streptomycin

商品名：STREPTOMYCIN 1GM

中文名：鏈黴素注射劑１克



一、此藥品的用途是什麼？

結核菌感染症、結核性腦脊髓膜炎、急性血行性栗粒結核、咽頭及喉頭結核症、氣管及支氣管結核性潰瘍、結核性肉芽增殖、乾酪性肺炎、滲出性肺結核、結核性皮膚瘻孔、潰瘍性腸結核、結核性腹膜炎、結核性心內膜炎、眼結核等。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人劑量

肌肉注射，治療結核病，與其他抗結核病藥合用，一天注射一次，一次1g。 如係老年病人，一天注射一次，500～750mg。

兒童劑量

按體重計算，每Kg肌肉注射5～10mg，每6小時注射1次，或每Kg肌肉注射10～20mg，每12小時注射1次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1小瓶加入3～5mL的注射用水或生理食鹽水，溶解後立即使用。

〔使用上的注意事項〕

・使用時加以溶解，溶解後需立即使用。

・水溶液為無色透明～淡黃色透明，溶解後水溶液稍帶顏色。

・為了防止耐性菌的出現，原則上確認感受性，投藥量為治療疾病的最短必要期間。

・有腎疾患的患者，應降低投藥量，或延長投藥間隔。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

感覺異常，眩暈，頭痛，過敏反應，耳毒性，腎毒性。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.13

用藥指導單張

衛教小組 DF14210101

學　名：Streptomycin

商品名：STREPTOMYCIN 1GM

中文名：鏈黴素注射劑１克



於15~30℃儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.13