用藥指導單張

衛教小組 DM2200101

學　名：Valganciclovir

商品名：VALCYTE FILM-COATED 450MG

中文名：克毒瘧膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 用於治療愛滋病患者罹患巨細胞病毒視網膜炎(CMV retinitis)。
2. 可用於預防接受固體器官移植患者中，具有發生巨細胞病毒疾病之高危險性族群(捐贈者血清巨細胞病毒陽性/受贈者血清巨細胞病毒陰性[(D+/R-)])。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Valcyte 為口服服用，且應與食物一起服用。

Valcyte 會快速、廣泛轉變為活性成分ganciclovir。

由Valcyte 轉變為ganciclovir 後，其生體可用率高於口服ganciclovir的10倍。

Valcyte膜衣錠的劑量及服用方式需嚴密遵守如下之建議。

成人

巨細胞病毒視網膜炎(CMV retinitis)之起始治療

對於治療活性巨細胞病毒視網膜炎(CMV retinitis)，建議劑量為900毫克，一天二次，總療程為21天。延長起始治療療程可能會增加骨髓毒性。

巨細胞病毒視網膜炎(CMV retinitis)之維持性治療

對於起始治療療程後，或非活性巨細胞病毒視網膜炎之病人，建議劑量為900 毫克，一天一次。若病人之視網膜炎情況惡化可以重複起始治療療程。(參閱巨細胞病毒視網膜炎(CMV retinitis)之起始治療)

維持治療的時間應依個別情況判定。

預防器官移植病人發生巨細胞病毒疾病

對於腎移植病人，於接受移植後10天內開始，一直使用到移植後200天，其建議劑量為900毫克，1天一次。對於接受除了腎移植以外的固體器官移植之病人，於接受移植後10天內開始，一直使用到移植後100天，其建議劑量為900毫克，一天一次。

Valcyte不建議使用於小孩。

三、使用時我該注意的特別事項？

在以Valcyte®（和ganciclovir）治療的病患中，曾觀察到有嚴重白血球減少症、嗜中性球減少症、貧血、血小板減少症、全血球減少症

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DM2200101

學　名：Valganciclovir

商品名：VALCYTE FILM-COATED 450MG

中文名：克毒瘧膜衣錠



、骨髓抑制毒性和再生不良性貧血之現象。若病患之嗜中性白血球絕對計數小於500 cells/μl或血小板小於25000/μl 或血紅素小於8 g/dl不應該開始治療。

Valcyte®不建議使用於小孩。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最嚴重和常見藥物不良反應為血液反應，包括嗜中性白血球減少症、貧血和血小板減少症。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15