

用藥指導單張

衛教小組 DG11840101

學名：Desmopressin

商品名：PMS-DESMOPRESSIN 0.1MG

中文名：沛卜淨錠



一、此藥品的用途是什麼？

中樞性尿崩症、原發性夜尿症(限用於7歲以上病患)、成人因夜間多尿所導致之夜尿症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

中樞尿崩症：對小孩及成人其初始劑量，0.1mg每天三次，再依患者情況加以調整。根據臨床實驗證明，每日劑量範圍0.2mg到1.2mg。對大多數病人最佳劑量為一天三次，每次0.1—0.2毫克。如有水分滯留或低血鈉症現象須停止投藥和調整劑量。

原發性夜尿症(限用於7歲以上病患)：初始劑量為睡前0.2mg。假如低劑量效果不佳，最高可增加至0.4mg。

治療3個月以後須再評估，停止pms-Desmopressin治療至少一星期。關於水分攝取須被觀察的，請參考注意事項。如有水分滯留須停止治療。成人因夜間多尿所導致之夜尿症：建議起始劑量為睡前0.1mg。假如治療一週後效果不佳，可增加至0.2mg和然後一週後再加至0.4mg。液體攝取須限制。在夜尿病患，在治療前須用排尿次數及排尿量的表紀錄至少兩整天來診斷夜間多尿症。夜間尿量產生超過功能性膀胱容量或超過24小時尿量產生的1/3可診斷為夜間多尿症。

三、使用時我該注意的特別事項？

在治療原發性夜遺尿和夜尿時最好在投藥前一小時到投藥後八小時間將液體的攝取限量到最低。治療時若沒有同時降低液體的攝取可能會導致體內水滯留和/或低鈉血症，並可能伴隨以下徵兆和症狀(頭痛、噁心/嘔吐、體重增加和嚴重時可能引起痙攣)。

所有患者，如果可能的話，其監護者必須嚴格執行患者本身對液體攝取的限制。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應(大於降低生育力之反應)，但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DG11840101

學名：Desmopressin

商品名：PMS-DESMOPRESSIN 0.1MG

中文名：沛卜淨錠



常見的副作用為頭痛。其他常見副作用分別為低鈉血症、頭暈、高血壓及胃腸道疾病(噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、及便秘)。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師