用藥指導單張

衛教小組 DA6400301

學　名：Adenosine

商品名：ADENOCOR★ 6MG/2ML

中文名：安室律注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

治療陣發性上心室心博過速、輔助診斷ＱＲＳ波變寬或變窄之複雜性上心室心博過速。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

治療劑量：

成　：

初劑量：快速靜脈注射3mg(超過2秒)。

第　次劑量：如初劑量無法在1-2分鐘內排除上　室　搏過速，則再快速靜脈注射6mg。

第三次劑量：如第　次劑量無法在1-2分鐘內排除上　室　搏過速，則再快速靜脈注射12mg。

增加或注射更　的劑量則不予建議。

診斷劑量：

可　上述劑量遞增表直　獲得　夠之診斷資料為　。

給藥　式：僅可以快速靜脈注射給藥。

三、使用時我該注意的特別事項？

心房顫動／撲動及有附屬繞道枝之病患可能會增加不規則路徑的傳導。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

心搏徐緩、結竇暫停、　跳不規律、　房期外收縮、房室傳導阻滯

室過度興奮，包括　室期外收縮，無法忍受的　室　搏過速。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.17

用藥指導單張

衛教小組 DA6400301

學　名：Adenosine

商品名：ADENOCOR★ 6MG/2ML

中文名：安室律注射劑



本藥不要冷藏，請於30℃以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.17