

用藥指導單張

衛教小組 DG11210101

學名：Testosterone

商品名：NATESTO NASAL GEL 60DOSE(自費)

中文名：耐他妥鼻內凝膠劑11公克



一、此藥品的用途是什麼？

適合在成年男性中作為睪固酮補充療法，經臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症的替代治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

啟用Natesto前，請先確定在至少兩個不同日子的早上測得血清睪固酮濃度，且血清睪固酮濃度低於正常範圍，藉此確認性腺功能低下的診斷。Natesto是一款睪固酮鼻用黏膠，劑型為內含定量幫浦的給藥器。每按一次幫浦可對每個鼻孔送出5.5 mg 的睪固酮。

每次用藥時需按兩下幫浦(一個鼻孔一次)，劑量合計為11.0 mg。

建議劑量

Natesto (睪固酮)的建議起始劑量為11.0 mg 睪固酮(一個鼻孔按一次)，每天經鼻給藥兩次，故每日總劑量為22.0 mg。為了確保妥善給藥，啟用療法後應測量血清總睪固酮濃度，以確保達到理想濃度(300 到1050 ng/dL)。Natesto的劑量可在啟用治療至少30 天後，根據單次抽血(晨間施用NATESTO 的20 分鐘至2 小時後)所得的血清總睪固酮濃度作調整。若總睪固酮測量值低於300 ng/dL，可依照醫師指示將每日睪固酮劑量由22.0 mg (每天用藥兩次)提高至33.0 mg (每天用藥三次)。

用法

若為每天使用兩次，Natesto 應在早上和晚上各施用一次(至少相隔6 小時)，且最好在每天同一時間點施用。應指示患者在每個鼻孔內按壓幫浦到底一次，以獲得完整劑量。若為每天使用三次，Natesto應在早上、下午和晚上各經由鼻子施用一次(約相隔6-8 小時)，且最好在每天同一時間點施用。

三、使用時我該注意的特別事項？

用於慢性鼻部病症和鼻部解剖構造變異患者：

由於缺乏安全性或療效方面的臨床資料，因此Natesto不建議用於下列患者：

- (1) 有鼻部疾患的病史；
- (2) 有鼻部或鼻竇手術的病史；
- (3) 有過去 6 個月內發生鼻部骨折或導致前鼻中隔彎曲之鼻部骨折的病史；
- (4) 患有黏膜發炎疾患(如修格蘭氏症候群)；

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DG11210101

學名：Testosterone

商品名：NATESTO NASAL GEL 60DOSE(自費)

中文名：耐他妥鼻內凝膠劑11公克



(5) 以及患有鼻竇疾病。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的不良事件為塗抹凝膠處的局部鼻部反應。

最常觀察到的是流鼻水、流鼻血和鼻部不適，這些狀況在大多數案例中都是輕微的暫時性反應。

六、此藥儲存時的條件為何？

請於室溫下25° C保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師