

用藥指導單張

衛教小組 DD5170301

學名：Dioctahedral smectite
商品名：SMECTA 3GM(舒腹達粉劑)
中文名：舒腹達口服懸液用粉劑



一、此藥品的用途是什麼？

治療2歲(含)以上兒童(併用口服脫水補充液)及成人之急性腹瀉。症狀性治療成人的慢性功能性腹瀉。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

治療急性腹瀉

2歲(含)以上的兒童：每日2-3袋。每日劑量分成3次服用

成人：

每日3袋，分成3次。實際上在治療剛開始時，每日劑量可以加倍。

其他適應症

成人：每日3袋，分成3次。

給藥方式

口服給藥

藥袋的內容物於使用前，才將其混合成懸浮液。

若為兒童，藥袋內容物應倒入奶瓶中和50ml的水混合，並於一天內分次給予，或與半流體食物混合，如肉湯、果泥、菜泥、嬰兒食品。

若為成人，藥袋內容物可與半杯水混合。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有嚴重慢性便秘病史的病人，應小心使用Diosmectite。
2. 嬰兒及2歲以下的兒童，應避免使用舒腹達。
3. 本品之橘子香草口味，含有葡萄糖和蔗糖。不建議使用於有果糖不耐受症(fructose intolerance)、葡萄糖和半乳糖吸收不良症候群(glucose and galactose malabsorption syndrome)或蔗糖酶/異麥芽糖酶缺乏症(sucrase / isomaltase deficiency)之病人。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD5170301

學名：Dioctahedral smectite
商品名：SMECTA 3GM(舒腹達粉劑)
中文名：舒腹達口服懸液用粉劑



四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

治療期間最常被通報的不良反應為便秘，發生於成人約7%及兒童約1%。若發生便秘，應停用diosmectite，且如需重新給藥，應給予較低劑量。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30°C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師