

用藥指導單張

衛教小組 DQ3070101

學名：Exemestane

商品名：AROMASIN★SUGAR COATED 25MG

中文名：諾曼癌素糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

具有雌激素受體陽性之停經婦女，使用Tamoxifen至少2年之早期侵犯性乳癌的輔助治療。已接受抗雌激素而無效之停經婦女晚期乳癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

口服，推薦劑量為一次25 mg，1日1次，宜飯後服用。採用AROMASIN的治療應堅持直至腫瘤進展。對肝腎功能不全患者無需劑量調整。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 處於停經前內分泌狀態的婦女不可使用，臨床使用前應通過評估LH、FSH和Estradiol來確認婦女處於停經後狀態。
2. 運動員慎用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的是面部潮紅和噁心。其他常見的不良事件是疲勞、出汗增加和頭暈。報導較少見的不良事件中，發生率 $\geq 2\%$ 的有頭痛、失眠、疼痛、皮疹、腹痛、厭食、嘔吐、抑鬱、脫髮、全身或下肢水腫、便秘和消化不良。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師