用藥指導單張

衛教小組 DM11240201

學　名：Tramadol

商品名：TRAMTOR 注射 ★100MG/2ML(管藥四)

中文名：頓痛特注射液



一、此藥品的用途是什麼？

中度至嚴重性的急慢性疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人及12歲以上青少年，單一劑量 50-100 毫克每 4-6 小時投予，每日劑量為 400mg。

注射液劑供肌肉、靜脈、皮下注射或靜脈輸注。

若在投予單一劑量 Tramadol Hydrochloride 50 毫克 30-60 分鐘後，仍無法達到疼痛減緩時，可給予第二次的單一劑量 50 毫克。若在嚴重性的疼痛可能有較高需求時，可給予較高單一劑量的 Tramadol Injection (100毫克)作為起始劑量。

取決於疼痛強度，藥效持續時間為 4-8 小時。在術後初期實際上可能需要更高的劑量的鎮痛劑來治療嚴重術後疼痛。劑量高於正常使用，需求通常不會超過 24 小時。一般而言，止痛劑量之使用應選擇最低有效劑量為先，除非有特殊的臨床需求，否則主成分每日最高劑量為 400 毫克(例如：癌症疼痛或術後疼痛)。

使用方法

緩慢地注射注射液，即每分鐘注射 Tramadol Injection 1毫升(相當於50毫克 Tramadol Hydrochloride)，或以輸注液稀釋後再輸注。

調製方式

詳見仿單。

三、使用時我該注意的特別事項？

Tramadol 務須經謹慎考慮，方可用於下列病人：鴉片類藥品依賴性、頭部外傷、休克、不明原因引起意識模糊、呼吸中樞或呼吸功能障礙、顱內壓增加。對於鴉片類藥品過敏之病人，Tramadol 應謹慎使用。對於有呼吸抑制之病人或併用中樞神經系統抑制劑(請參閱7. 交互作用)，或明顯超過建議的每日最高劑量(請參閱9. 過量)，治療時

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25

用藥指導單張

學　名：Tramadol

商品名：TRAMTOR 注射 ★100MG/2ML(管藥四)

中文名：頓痛特注射液



應小心照護，在這種情況下，呼吸抑制不能排除。

有報告指出曾有病人在服用 Tramadol 建議劑量下發生痙攣。當 Tramadol Hydrochloride 的劑量超過每日最高劑量上限(400毫克)時，這種危險性可能會增加。此外 Tramadol 可能會使正在服用降低大發作閾值藥物之病人，增加產生大發作之危險性 (請參閱7. 交互作用)。唯有在特殊情況下才考慮對具有癲癇或可能發生大發作之病人投予 Tramadol。

Tramadol 有產生依賴性的可能，長期使用可能會產生耐受性，造成生理及心理依賴。病人若有藥物濫用或依賴性的傾向時，所採取的應是短期治療，並且配合嚴格的醫療觀察。有生理依賴性的病人若突然停藥，戒斷症狀有可能會發生。雖然 Tramadol 屬於鴉片類作用劑，但無法抑制嗎啡戒斷症狀， Tramadol 不能作為鴉片依賴性病人之取代物。

即使是根據指示使用，Tramadol 也可能會引起像是昏昏欲睡和暈眩的現象，因此，可能損害駕駛和機械操作員的反應能力。這結果與其他精神干擾性物質，尤其是酒精，合併使用時更是顯著。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

最常被報導的副作用是嘔吐和暈眩。

六、此藥儲存時的條件為何？

於25° C以下避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25