用藥指導單張

衛教小組 DM16270101

學　名：Penicillin G benzathine

商品名：PENICILLIN G BENZATHINE INJ 2.4MIU/5ML(專案進口)

中文名：

一、此藥品的用途是什麼？

對benzathine penicillin G具有感受性之菌株所引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量：

風濕熱復發預防：每 15 天肌肉注射一次。

- 成人：2.4 MIU
- 兒童：0.6－1.2 MIU（依年齡而定）

梅毒與雅司病治療：每 8 天肌肉注射 2.4 MIU

配製方法：

向藥瓶內加入 5 mL 注射用無菌水 溶解。

使用前充分搖勻。

僅供 深部肌肉注射，不可靜脈注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

如同所有藥物，本藥可能在部分患者中引起不同程度的不良反應。

- 腸胃道症狀：噁心、嘔吐、腹瀉、念珠菌感染。
- 過敏反應：蕁麻疹、嗜酸性白血球增加、血管性水腫、呼吸困難，極少數可能出現過敏性休克。
- 皮疹（可能為過敏或非過敏）。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 8° to 25° C。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25