用藥指導單張

衛教小組 DA7620301

學　名：Furosemide

商品名：LASIX（注射）20MG/2ML

中文名：來適泄注射液



一、此藥品的用途是什麼？

利尿、高血壓、急性肺水腫。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人—20～40mg，靜注或肌注，單一劑量可以20mg的增加量來增加，每2～3小時1次，直到所要的反應出現；急性肺水腫—40mg靜注，要1～2分鐘以上，1小時後，可以增加到80mg；孩童—1mg/kg肌注或靜注，能增加2mg/kg，但比前一劑不能在2小時內增加。最大量6mg/kg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 要知道這類的藥物會造成嚴重的脫水和電解質的排空(特別是老年人或虛弱的病人)可能導致循環虛脫。因此，要以小劑量開始治療，然後根據血清中電解質的濃度和臨床的反應，小心的調整劑量。
2. 要注意病人是否產生電解質不均衡的徵兆(如食慾不振、口乾、口渴、心跳過快、胃腸發生障礙、不安、眩暈、虛弱、倦怠、肌肉疼痛性痙攣)，一有發現就要向醫師報告，通常要考慮調整劑量和/或補充電解質(口鉀或鈉)。
3. IV投與時要仔細的監視，太快或過度的利尿，會導致低血容積，低血壓和血管虛脫，要經常的測定血壓。同時要避免注射液外溢，因為這樣通常會造成疼痛和刺激。
4. 糖尿病患者或疑似患者使用本品時，要定期的測定血糖和尿糖，要注意病人的血糖是否增加，或對葡萄糖的耐受性是否改變；如果有所發現，就要向醫師報告。
5. 下列情況使用本品宜小心：肝壞死、糖尿病、痛風、或心源性休克、以及接受毛地黃或排空鉀質之類固醇治療的病人、和老年人等。
6. 投與本品要在早晨為之，最遲為下午，應該避免夜尿和中斷睡眠，要向病人強調按照處方規律服藥的重要性。每當IV投與時，要監測輸注的速率，其速率通常不可超過4mg/分。
7. 於Furosemide治療期間，常發生血中尿酸濃度升高的現象;因此可能使易發病患者的痛風發作。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DA7620301

學　名：Furosemide

商品名：LASIX（注射）20MG/2ML

中文名：來適泄注射液



C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

起立性低血壓(開始治療時)，嘔吐、頭痛、視力模糊、耳鳴；較少發生者：胃腸刺激、便秘、身體不適、白血球過少、貧血、蕁麻疹、對光敏感，多發性紅斑、剝落性皮膚炎、壞死性血管炎，虛弱、尿意頻繁、泌尿道膀胱痙攣、血栓靜脈炎。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15