用藥指導單張

衛教小組 DM2150101

學　名：Valaciclovir

商品名：VALTREX 500MG

中文名：祛疹易錠



一、此藥品的用途是什麼？

帶狀疱疹、復發性生殖器疱疹。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人劑量：治療帶狀疱疹，一天三次，每次1000mg，持續七天。復發性感染應持續治療五天，初次感染可能較為嚴重，療程有時必須持續長達十天。應儘早開始服藥。最好是在單純疱疹復發的前兆或出現復發徵兆時立即服用。
2. 兒童劑量：尚無資料。
3. 老人劑量：除腎功能嚴重損傷，否則無需調整劑量，但應持續攝取適量的水份。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.腎功能嚴重受損的患者，需調整劑量。2.許多體內與體外的致突變性試驗結果顯示valaciclovir不可能有對人類造成基因突變的危險。對大白鼠及小老鼠的生物實驗中，valaciclovir沒有致癌性。3.Valaciclovir對大白鼠或兔子沒有致畸性。4.ValacicIovir口服給藥，不會影響雄鼠或雌鼠的生殖力。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

於治療帶狀疱疹或單純疱疹的臨床試驗中，最常見副作用是輕微的頭痛和噁心、這些症狀在使用valaciclovir, aciclovir和安慰劑的患者皆有相似的比率、臨床試驗顯示，免疫力嚴重受損的患者長期服用高劑量的valaciclovir(一天8g)，曾發生腎功能不全、小血管病變性溶血性貧血及血小板過低症等狀況(有時是合併出現)、具有相同病況，卻未接受valaciclovir治療的患者也曾經發生這些狀況。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DM2150101

學　名：Valaciclovir

商品名：VALTREX 500MG

中文名：祛疹易錠



六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15