

用藥指導單張

衛教小組 DC11260101

學名：Acetaminophen

商品名：acetaMINOPHEN (LACTAM) 500MG

中文名：利克痛錠



一、此藥品的用途是什麼？

退燒、止痛。

(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人及12歲以上：發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，每次1~2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過4次。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量1/4。

3歲以下，請洽醫師診治。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有下列情形者，請勿使用：

(1) 曾因本藥成分引起過敏的人。

2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(1) 3歲以下。

(2) 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

(3) 有肝臟疾病的人。

3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(2) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

4. 其他使用上注意事項：

(1) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 勿超過建議使用量。

(4) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC11260101

學名：Acetaminophen

商品名：acetaMINOPHEN (LACTAM) 500MG

中文名：利克痛錠



的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師