用藥指導單張

衛教小組 DC11260101

學　名：Acetaminophen

商品名：acetaMINOPHEN(LACTAM) 500MG

中文名：利克痛錠



一、此藥品的用途是什麼？

退燒、止痛。

（ 緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛 ）

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人及12歲以上：發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4～6小時可重複服用，每次1～2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過4次。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量1/4。

3歲以下，請洽醫師診治。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有下列情形者 ，請勿使用：

(1) 曾因本藥成分引起過敏的人。

2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(1) 3歲以下。

(2) 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

(3) 有肝臟疾病的人。

3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(2) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

4. 其他使用上注意事項：

(1) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 勿超過建議使用量。

(4) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不 知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09

用藥指導單張

衛教小組 DC11260101

學　名：Acetaminophen

商品名：acetaMINOPHEN(LACTAM) 500MG

中文名：利克痛錠



的藥品，但是每天服用 Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時， 應停藥並就醫。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09