


用藥指導單張

衛教小組 DI8980301

學名：Oxytocin

商品名：OXYTOCIN ★INJ 10IU/ML (婦產科用藥)

中文名：歐利生注射液



一、此藥品的用途是什麼？

催產及減少產後出血。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 用於誘導分娩：劑量3IU(0.3ml)皮下或肌肉注射，按需要每隔20~30分鐘可在同量使用或將10IU(1ml)加入1000ml 5%葡萄糖或生理食鹽水中，予以稀釋，以每分鐘15滴由靜脈輸入。

2. 用於止血：0.6~2IU(0.06~0.2ml)加入3~5ml 生理食鹽水中稀釋緩慢靜脈注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有下列情況原則上勿用：兒頭骨盤不均衡、全前置胎盤、常位胎盤早期剝離、過強陣痛、子宮迫切破裂以及胎兒窘迫等。

2. 適用上注意：靜脈注射（尤其與麻醉劑，昇壓劑等併用時）需注意血壓，緩慢行之。

3. 本劑常於誘導分娩時應用，故對子宮收縮不能將胎兒壓出之長時間分娩病例，或引發微弱陣痛之治療目的而使用，應用本品宜極謹慎。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

a. 休克：虛脫異常場合，請中止使用。

b. 子宮：過強陣痛、子宮破裂、頸管裂傷、羊水栓塞症、微弱陣痛、弛緩出血等現象。

c. 胎兒、新生兒：胎兒窘迫，須仔細觀察，有新生兒黃疸報告。

d. 循環系：不整脈，靜注後有血壓下降或血壓上升等現象。

e. 消化系：噁心、嘔吐。

f. 過敏症：過敏症狀出現，及水中毒症狀。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DI8980301

學名：Oxytocin

商品名：OXYTOCIN ★INJ 10IU/ML (婦產科用藥)

中文名：歐利生注射液



藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師