


用藥指導單張

衛教小組 DD8740201

學名：Butylscopolamine

商品名：ESCOPAN INJ. 20MG/1ML

中文名：胃使可胖注射液



一、此藥品的用途是什麼？

胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣及其運動障礙、尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人與12歲以上之青少年

每日1-2安瓿，緩慢地以靜脈、肌肉或皮下注射，每日數次。每日最大劑量不可超過100mg。

嬰兒及兒童

在嚴重的案例，每次以每公斤體重0.3-0.6mg的劑量，緩慢地以靜脈、肌肉或皮下注射，每日數次。每日最大劑量不可超過每公斤體重1.5mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

未經診斷及治療之窄角性青光眼病患投予抗膽素性藥物，如Escopan，其眼內壓可能會上升。若注射Escopan後，眼睛疼痛、發紅、視力喪失，應立即請教眼科醫師。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

口渴、心跳過快、尿液滯留。

六、此藥儲存時的條件為何？

本品應於室溫下貯之。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師