用藥指導單張

衛教小組 DA16330101

學　名：Fibrinogen human

商品名：HAEMOCOMPLETTAN P INJ. 1G(自費/向上)

中文名：凝血纖維蛋白原注射液



一、此藥品的用途是什麼？

出血症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 先天性低(hypo-)、異常(dys-)或無纖維蛋白原血症及已知出血傾向的患者之預防。為預防在手術過程中發生的大量出血現象，建議使用預防性治療，提升纖維蛋白原濃度至 1 g/l 並且維持纖維蛋白原在此濃度至安全止血，及 0.5g/l 以上直到傷口癒合完全。於手術過程或針對出血事件的治療，需依照以下公式計算劑量：纖維蛋白原劑量(mg/kg 體重)＝［目標濃度(g/l)－測量濃度(g/l)］/ 0.017 (g/l 每 mg/ kg 體重) 合適的後續劑量（注射劑量及頻率）應以患者的臨床狀況和實驗室報告為依據。纖維蛋白原之生物半衰期為 3-4 天。因此當缺乏消耗量時，通常不需要重複投與人體纖維蛋白原。累積現象會發生於預防性使用的重複投與，劑量及注射頻率應依據醫生給予患者的治療目標而決定。

2. 出血

治療成人針對手術前後期間出血，通常投與 1-2g（或 30mg/kg 體重），視需要後續輸注。嚴重出血的狀況，如產科用(obstetric use) / 胎盤剝離(abruption placenta)，可能需要大量（4-8g）的纖維蛋白原。

孩童

劑量應依體重及其臨床需要決定，但大多為 20-30 mg/kg。

投與方式

靜脈輸注或注射。

Haemocomplettan 應依據章節 6.6 配製。配製後的溶液應於投與前回溫至室溫或體溫，然後以患者最舒適的速度緩慢注射或輸注。每分鐘的注射或輸注速度約不超過 5ml。

三、使用時我該注意的特別事項？

當先天性缺乏之患者使用人體纖維蛋白原治療時有其風險，尤其是投與高劑量或重複給藥時。在給予患者纖維蛋白原時，應嚴密的觀察血栓的徵兆及症狀。

有冠狀心臟疾病或心肌梗塞病史的患者、有肝臟疾病的患者、在手術

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21

用藥指導單張

衛教小組 DA16330101

學　名：Fibrinogen human

商品名：HAEMOCOMPLETTAN P INJ. 1G(自費/向上)

中文名：凝血纖維蛋白原注射液



前或後的患者、新生兒或具血栓栓塞或瀰漫性血管內凝血症風險的患者，應衡量使用人體血漿纖維蛋白原之潛在利益及血栓栓塞併發症的風險，同時應執行謹慎及嚴密的監控。

後天性低纖維蛋白原血症與所有凝血因子（不僅是纖維蛋白原）及抑制子的低血漿濃度有關，因此使用含有凝血因子的血液製劑治療時應予以評估。謹慎監控凝血系統是必須的。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

全身性蕁麻疹、紅疹、呼吸困難、心搏過速、噁心、嘔吐、冷顫、發熱、胸痛、咳嗽、血壓下降及過敏性休克。

六、此藥儲存時的條件為何？

貯存於冰箱中(2℃-8℃)，切勿冷凍！小瓶應放置於外盒內以避光。

配製後產品之物化安定性已經證實室溫下可達 8 小時(最高 +25 ° C)。從微生物學觀點來看，本產品應在配製後立即使用。若配製後產品未立即投與，室溫下貯存不應超過 8 小時(最高 +25 ° C)。配製後產品不應儲存於冰箱。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21