用藥指導單張

衛教小組

學　名：Cephalexin

商品名：CEPHALEXIN 500MG

中文名：賜福力欣膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人一次250~500mg，每6小時一次。
2. 孩童一天25～50mg/kg分4次使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

服用本劑後，可能有假性糖尿反應，可用Clinistix試劑則不生此 現象，青黴素過敏患者Cephalexin有好之耐受性，應注意其交互 過敏反應，腎機能降低時應減量服用，孕婦應謹慎使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、腹瀉、腹部不適、消化不良。

六、此藥儲存時的條件為何？

避光貯存30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26