用藥指導單張

衛教小組 DM3160101

學　名：Nystatin

商品名：NYSTATIN（口服）CAP

中文名：寧司泰定膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

腸道念珠菌感染症之預防與治療、當廣效性抗生素或類固醇療法時併用為念珠菌過度增殖之預防療法。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常每次1～2粒，一天三到四次服用之。（當臨床症狀消失後仍須繼續服用48小時以上，以防其復發）。

三、使用時我該注意的特別事項？

孕婦之使用其安全性尚未確立，僅限於治療上的有益性大於可能產生的危險性時使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

口服大量時會偶現腹瀉及胃腸障礙。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫15～30℃保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09