

用藥指導單張

衛教小組 DM6920201

學名：Cefazolin

商品名：STAZOLIN INJ 1GM

中文名：賜爾寧注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌所引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

通常成人1天1g(力價)，小兒按體重1天20-40mg(力價)/kg，分2次，慢慢地靜脈注射，亦可肌肉注射。

從症狀及感染菌之感受性而判斷效果不十分顯著，可增至成人1天1.5g~3g(力價)，小兒按體重1天50mg(力價)/kg，分3次投與。

症狀特別嚴重時，成人1天可以5g(力價)，小兒按體重1天100mg(力價)/kg，分次投與。此外，亦可加入輸液內點滴靜脈注射。

注射液之調劑：

1. 靜脈注射

本品須用注射用水，生理食鹽水或葡萄糖注射液溶解。

2. 肌肉注射

本品須用Lidocaine HCl 注射液(0.5w/v%) 約2~3ml 溶解。溶解500mg(力價) 約使用2ml 溶解。

此外，溶劑量多寡或溫度不同都可能造成溶解度之差異，若有白濁或再結晶析出之情形，以溫水(約40℃)水浴，待其變成透明溶液即可使用。另外，溶解後在避光，室溫中保存，須在48小時內使用之。若以生理食鹽水溶解，請立即使用完畢。

1、本品用於術前預防感染時，應於手術劃刀前0.5-1小時，以靜脈注射或肌肉注射投予。

2、以靜脈推注給藥時，應以超過3-5分鐘緩慢注入靜脈或病人原有之靜脈輸注管中。

3、當單一劑量超過1g時，建議以靜脈輸注30-60分鐘之方式給藥。

三、使用時我該注意的特別事項？

下列患者慎重投與：

(1) 對Penicillin 類或Cephem 類(Cephalosporin 類或Cefamycin

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM6920201

學名：Cefazolin

商品名：STAZOLIN INJ 1GM

中文名：賜爾寧注射劑



類) 藥物有過敏之既往病歷的患者。

(2) 本人、父母或兄弟姐妹間有易發支氣管氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏體質之患者。

(3) 有重度腎障礙的患者(此時因血中濃度持續較久，所以須將投與間隔延長)。

(4) 對不能正常進食，或非經口攝取營養者、高齡者，全身狀態不良者。(因可能會出現維他命K 缺乏症狀，所以要嚴密觀察)。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

偶有噁心、嘔吐、食慾不振。

史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens Johnson syndrome)

六、此藥儲存時的條件為何？

請貯存於25℃環境下。本藥受光線照射，外觀顏色會慢慢加深，所以開封後須注意保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師