


用藥指導單張

衛教小組 DM8470101

學名：Immunoglobulins, normal human, for intravascular

商品名：PRIVIGEN 10% 50ML (依診斷事審)

中文名：瑞利勁人體免疫球蛋白靜脈注射液



一、此藥品的用途是什麼？

作為替代療法：

1. 原發性免疫不全症如：(1)先天性丙種免疫球蛋白缺乏症及丙種免疫球蛋白過低症 (2)常見變異性免疫不全症 (3)嚴重複合型免疫不全症 (4)Wiskott-Aldrich氏症候群
2. 慢性淋巴性白血病引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染者，且預防性抗生素治療無效的患者。
3. 多發性骨髓瘤穩定期(plateau phase) 引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且施打肺炎鏈球菌疫苗無效的患者。
4. 異體造血幹細胞移植後引致丙種免疫球蛋白過低。
5. 先天性愛滋病(AIDS)伴隨復發性細菌感染者。

作為免疫調節：

1. 免疫性血小板缺乏紫斑症且具高出血風險或用於手術前矯正血小板計數。
2. 格林-巴利症候群。
3. 川崎氏症。
4. 慢性脫髓鞘多發性神經炎，對孩童的使用經驗有限。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

原發性免疫不全症的替代療法建議劑量為每3-4週0.2-0.8 g/kg bw (2至8 mL/kg)。

如果患者錯過一劑治療，應儘速補接受錯過的治療，並恢復每3-4週的定期治療。

慢性淋巴性白血病引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且預防性抗生素治療無效的患者；多發性骨髓瘤穩定期引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且施打肺炎鏈球菌疫苗無效的患者；

先天性愛滋病(AIDS)伴隨復發性細菌感染者的替代療法建議劑量為每3-4週0.2-0.4 g/kg bw。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM8470101

學名：Immunoglobulins, normal human, for intravascular

商品名：PRIVIGEN 10% 50ML (依診斷事審)

中文名：瑞利勁人體免疫球蛋白靜脈注射液



異體造血幹細胞移植後引致三種免疫球蛋白過低的替代療法建議劑量為每3-4週 0.2-0.4 g/kg bw。血清中IgG最低濃度應維持高於5 g/L。

免疫性血小板缺乏紫斑症 (ITP) 建議劑量為連續2天1 g/kg bw (總劑量為2 g/kg bw)。

格林-巴利症候群 (Guillain-Barre Syndrome) 0.4 g/kg bw/day, 給與約5天。對孩童的使用經驗有限。

川崎氏症 (Kawasaki Disease) 應以分次劑量方式給與2到5天, 總劑量為1.6到2.0 g/kg bw。或是, 單次劑量2.0 g/kg bw。患者應合併接受乙醯柳酸 (acetylsalicylic acid) 的治療。

慢性脫髓鞘多發性神經炎 (CIDP) 建議起始劑量為2 g/kg bw, 並於連續2-5天內分次給與。後以1 g/kg bw的維持劑量, 每3週於1天或連續2天內分次給予。

給藥方式

Privigen應以靜脈輸注。

輸注速率

本產品初始輸注速率應為0.3 mL/kg bw/hr (0.5 mg/kg bw/min) (注射約30分鐘)。

三、使用時我該注意的特別事項？

Privigen是單次使用的。

因溶液不含任何防腐劑, Privigen一旦開封後應立即使用/輸注。使用指示與處理

Privigen是可立即使用的溶液。使用前, 本產品應置於室溫或是體溫。施打Privigen時應使用過濾器的輸注管線。須刺穿塞蓋之中心有標記處的區域。

若需要稀釋, 應使用5%葡萄糖溶液作為稀釋液。欲配置50 mg/l (5%) 的免疫球蛋白溶液, 需將Privigen 100 mg/l (10%) 與等量5%葡萄糖溶液進行稀釋。Privigen稀釋過程中一定是使用無菌的技術。

Privigen一定不可與生理食鹽水混合, 然而, 用生理食鹽水潤洗輸注管是允許的。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考, 如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DM8470101

學名：Immunoglobulins, normal human, for intravascular

商品名：PRIVIGEN 10% 50ML (依診斷事審)

中文名：瑞利勁人體免疫球蛋白靜脈注射液



頭痛、血壓增高(高血壓)、背痛、發冷、發熱、疲勞、衰弱。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C以下保存於原容器中，避免光照。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師