

用藥指導單張

衛教小組

學名：Hyoscyamine

商品名：NUSPAS 0.125MG

中文名：痙得寧錠



一、此藥品的用途是什麼？

下列疾患之痙攣及運動機能亢進、胃潰瘍、胃酸分泌過多、內臟痙攣、痙攣性結腸炎、膀胱炎、幽門痙攣、妊娠嘔吐、腎痙痛、膽痙痛、痛經。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人及12歲以上兒童：一次1~2錠，每4小時或需要時一次，每日不超過12錠。

2~12歲兒童：一次1/2~1錠，每4小時或需要時一次，每日不超過6錠。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 下列患者應謹慎用藥：自主神經疾患者，甲狀腺機能亢進、冠心病、鬱血性心衰竭、心律不整、高血壓及腎臟疾病患者。
2. 使用抗膽鹼性藥物前應檢查患者有否心跳過速現象以避免藥物可能造成心跳加速之現象。
3. 本藥於罹患裂孔性疝氣併逆流性食道炎患者應小心用藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

口乾、嗜睡、眩暈、尿液滯留、心悸、視力模糊、噁心、嘔吐、便秘。

六、此藥儲存時的條件為何？

本品應貯存於 25℃ 下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師