


用藥指導單張

衛教小組 DL8750201

學名：Diazepam

商品名：DuPin ★inj(不可稀釋) 5MG/ML 2ML(管藥四)

中文名：樂平注射液



一、此藥品的用途是什麼？

焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣、癲癇重積狀態。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量：

1. 抗焦慮劑：

(1) 手術前給藥：必須依照個別狀況決定劑量；通常肌肉或靜脈注射 5 mg-10 mg，手術前給予之。

(2) 焦慮症狀：肌肉或靜脈注射，2mg-10mg（中等程度症狀給予2mg-5 mg，嚴重症狀給予5 mg-10mg），必要時，三至四小時再重覆給藥。

2. 酒精戒斷之鎮靜、安眠劑：肌肉或靜脈注射，先給予10mg，必要時，每三至四小時再投予5mg-10mg。

3. 健忘劑(Amnestic)

(1) 心律轉換術(Cardioversion)：靜脈注射，5mg- 15mg，實施前五至十分鐘給藥。

(2) 內視鏡診斷作業：靜脈注射(較佳途徑)：最高可達20mg，劑量應標定至得到所期待的鎮靜反應，而且在操作前給藥。肌肉注射：5mg-10mg，大約在操作前三十分鐘給藥。

4. 抗痙攣劑—癲癇重積狀態及嚴重再發性痙攣發作：肌肉或靜脈注射(靜脈注射較佳)，初劑量5-10mg，必要時每隔10-15分鐘重覆給藥，可達最高劑量30mg。必要時每2-4 小時重覆給藥。

5. 骨骼肌鬆弛修飾劑（中樞作用性）—肌肉痙攣：肌肉或靜脈注射，初劑量，5-10mg，必要時每隔3-4 小時重覆給藥。對強直性痙攣可能需要較大劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 病人對任何一種Benzodiazepines 類藥物過敏，對本藥亦可能產生過敏。

2. 本藥會通過胎盤障壁。

3. 懷孕前期三個月使用本藥會增加先天性畸型的危險，故應就其使用之危險與效益加以考慮，最好避免使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL8750201

學名：Diazepam

商品名：DuPin ★inj(不可稀釋) 5MG/ML 2ML(管藥四)

中文名：樂平注射液



D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

便秘，腹瀉，眩暈，思睡，頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥應儲於陰涼（15-30℃）避光處所並避免冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師