

用藥指導單張

衛教小組 DB6050201

學名：Fluticasone 100mcg, Salmeterol 50mcg

商品名：SERETIDE 100 ACCUHALER 60DOSE (高劑量)

中文名：使肺泰100 準納乾粉吸入劑



一、此藥品的用途是什麼？

SERETIDE適用於可逆性呼吸道阻塞疾病 (ROAD) 之常規治療，包括適合使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之患有氣喘的兒童與成人。這可能包括：正在使用長效型乙型作用劑 (BETA-AGONIST) 及吸入型皮質類固醇之有效維持劑量的患者。正在接受吸入型皮質類固醇療法，而仍有症狀之患者。接受支氣管擴張劑之常規治療，而需要吸入型皮質類固醇之患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 本品僅供口腔吸入使用。患者必須明白，即使沒有症狀，仍須常規使用本品，才能得到最佳臨床效益。患者必須定期接受醫師的評估，以維持最適當的本品強度，並且只有在醫師的指示之下，才可改變。劑量必須調整到能夠有效控制症狀的最低劑量。必須根據患者的疾病嚴重度，給予含有最適當fluticasone propionate劑量。
2. 建議劑量：成人及十二歲以上之青少年；每日兩次，每次吸一單位劑量（50 μ g salmeterol及100 μ g fluticasone propionate）；或者每日兩次，每次吸一單位劑量（50 μ g salmeterol及250 μ g fluticasone propionate）。四歲以上之兒童：每日兩次，每次吸一下（50 μ g salmeterol及100 μ g fluticasone propionate）。目前還沒有四歲以下幼兒使用本品的資料。

三、使用時我該注意的特別事項？

不可驟然停藥，病患平時應備有急性氣喘發作緩解劑，服藥期間定期回診，務必遵照醫師指示服用，用後請漱口。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB6050201

學名：Fluticasone 100mcg, Salmeterol 50mcg

商品名：SERETIDE 100 ACCUHALER 60DOSE (高劑量)

中文名：使肺泰100 準納乾粉吸入劑



Seretide含有兩種成分，所以兼有兩藥的副作用，但並無額外的藥物不良反應。Salmeterol：顫抖、肌肉痙攣、頭痛、不安、失眠、心悸、血鉀降低、血糖升高等；Fluticasone：頭痛、喉嚨發炎、鼻塞、發音障礙、聲音嘶啞、口腔念珠菌感染等。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師