


用藥指導單張

衛教小組 DA7010101

學名：Gelatin 40mg, NaCl 7.01mg, NaOH 1.36mg/ml

商品名：GELOFUSINE 500ML

中文名：佳樂施注射液



一、此藥品的用途是什麼？

急性出血、手術或外傷所引起之休克。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本劑需就患者需求，及監測循環參數（如血壓）予以調整用量及輸注時間、速率。為能及早確認過敏反應，輸注之初20~30ml 需緩慢注射且仔細監測。

本劑需靜脈給予。

以下為成人建議用量：

1. 低血容積、低血壓及輕微低血壓（如少量失血、及血漿流失），平均劑量：500~1000ml。
2. 嚴重低血壓，平均劑量：1000~2000ml。
3. 緊急並有致命症狀，以 500ml 快速輸注，待循環系統有所改善後，再就體液流失作適當比例輸注。
4. 血液稀釋（等量）：Gelofusine 可用於每天血流失量的補充（每天不超過20mg/kg）
5. 體外循環：依使用之循環系統而定，通常為 500~1500ml。
6. 若患者為凝血不易、腎功能不全、慢性肝病者，建議依個人臨床情況，並考慮臨床化學監測所得作劑量調整。

三、使用時我該注意的特別事項？

下列事項需留意：

- 必要時給予電解質。
- 必要性監視：

監視血中體平衡及血清電解質，特別是高鈉血症、脫水症狀及腎功能不良患者。

如果是血液凝固障礙及慢性肝病者，其凝固檢測與血清白蛋白需被監視，因為可能會有過敏反應

（anaphylactic/anaphylactoid）需對病人適當監視。

1. 取用時：

- 1) 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DA7010101

學名：Gelatin 40mg, NaCl 7.01mg, NaOH 1.36mg/ml

商品名：GELOFUSINE 500ML

中文名：佳樂施注射液



瓶塞鬆動。若有上述情形時，請勿使用。

2) 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

2. 輸液套選用及插入法：

1) 請依輸液套使用方法正確使用。

2) 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割 (Coring) 產生碎片。

3) 使用前請在檢視，確定無異物後，方可使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

在輸注 Gelofusine 後可能發生不同嚴重性的過敏反應，而多為皮膚反應（蕁麻疹）或臉頸潮紅。少部份會有血壓下降、休克、心肺功能停止。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師